

[Magen Darm Grippe](#)

[Durchfall](#)

[Erbrechen](#)

[Brechdurchfall](#)

[Fieber](#)

Information

[Erreger](#)

[Übertragung](#)

[Vorbeugung](#)

[Magen](#)

[Darm](#)

[Brechdurchfall](#)

Wie der Begriff bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um gleichzeitig oder abwechselnd auftretendes Erbrechen und Durchfall.

Die Kombination dieser beiden krankheitsbedingten Symptome ist bei einer Magen-Darm-Grippe nicht ungewöhnlich.

Therapie

[Medikamente](#)

[Behandlung](#)

Sonstiges



Bei Brechdurchfall wird häufig zu Hausmitteln wie Tee, Kola und Zwieback gegriffen.

[Magen Darm Grippe bei](#)

[Kindern](#)

[Beratung](#)

[Meldestellen](#)

[Kontakt / Impressum](#)

[Sitemap](#)

Bezeichnung

Brechdurchfall, Happe oder Bauchgrippe sind volkstümlich und regional unterschiedliche Bezeichnungen der Magen-Darm-Grippe.

Inkubationszeit

Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Auftreten der ersten Symptome (Inkubationszeit) kann zwischen 10 und 50 Stunden liegen.

Hinweis Das Informationsportal Magen-Darm-Grippe.de wird kostenlos zur Verfügung gestellt von der PR Agentur Berlin und Eventelligence Ltd.

Kontakt:

Berlintelligence.de & PR-Agentur-Berlin.de
Eventelligence Ltd.

Corinthstraße 54 & Bossestraße 10
10245 Berlin

Ansprechpartner: Daniel Knapp

Fon: +49 (0)30 293 8197-10

Fax: +49.(0)30 293 8197-29

Email: mail@pr-agentur-berlin.de

Internet: www.pr-agentur-berlin.de